



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Gebrauchsanweisung

GeloTonsil®

Gurgelgel

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie sich folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhaltsstoffe:

GeloTonsil® Gurgelgel enthält: Xanthan und Natriumhyaluronat

Weitere Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Xylitol, Dexpanthenol, Dinatriumhydrogenphosphat, Citronensäure, Wasserstoffperoxid und Sucralose

Inhalt: 200 ml

Anwendungsgebiet:

GeloTonsil® Gurgelgel dient der unterstützenden Therapie von Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Halsschmerzen und Schluckbeschwerden werden gelindert, indem sich GeloTonsil® Gurgelgel als ein Schutzfilm auf die gereizte Rachenschleimhaut legt.

Wirkprinzip

GeloTonsil® Gurgelgel wirkt physikalisch. Beim Gurgeln legt sich das viskose Gurgelgel als ein Schutzfilm auf die Mund- und Rachenschleimhaut und befeuchtet diese.

Durch die Befeuchtung wird die Mund- und Rachenschleimhaut vor Austrocknung, Reizungen und äußeren Einflüssen, die Halsschmerzen verursachen können, geschützt.

Die gereizte und entzündete Rachenschleimhaut wird durch die Anwendung von GeloTonsil® Gurgelgel gespült, wodurch Erreger von Halsschmerzen, vor allem Viren, mechanisch entfernt werden. Durch die gelbildenden Bestandteile Xanthan und Hyaluronsäure legt sich ein schützender Gelfilm auf die entzündete Schleimhaut, beruhigt sie und bewahrt sie vor weiteren äußeren Einflüssen. Die in GeloTonsil® Gurgelgel enthaltene Hyaluronsäure erhöht das Feuchthaltevermögen und verstärkt die Anhaftung des Schutzfilms auf den Schleimhäuten. Zusätzlich ist Dexpanthenol als pflegender Bestandteil enthalten. Gereizte Bereiche können sich wieder regenerieren.

Gegenanzeigen und Hinweise:

GeloTonsil® Gurgelgel darf bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile nicht angewendet werden. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nicht gleichzeitig mit anderen in Mund und Rachen anzuwendenden Mitteln. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nur, wenn Sie sicher gurgeln können. Augenkontakt ist zu vermeiden.

GeloTonsil® Gurgelgel enthält keinen Alkohol und ist frei von tierischen Bestandteilen.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden. Kinder ab 3 Jahren sollten GeloTonsil® Gurgelgel nur anwenden, wenn sie sicher gurgeln können.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

GeloTonsil® Gurgelgel darf während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Was ist sonst bei bestimmten Patientengruppen zu beachten?

GeloTonsil® Gurgelgel ist zuckerfrei und für Diabetiker geeignet.

Nebenwirkungen:

Für GeloTonsil® Gurgelgel sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Art und Dauer der Anwendung:

GeloTonsil® Gurgelgel ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt zum Gurgeln verwendet. Verwenden Sie zum Abmessen einen Esslöffel. Mit unverdünntem GeloTonsil® Gurgelgel etwa 30 Sekunden lang gurgeln. Danach spucken Sie GeloTonsil® Gurgelgel aus und spülen nicht nach. Ein unbeabsichtigtes Verschlucken kleinerer Mengen von GeloTonsil® Gurgelgel ist unbedenklich.

Wie oft sollten Sie GeloTonsil® Gurgelgel anwenden?

Die empfohlene Menge zum Gurgeln beträgt 3 x täglich 1 Esslöffel (10–15 ml).

Vermeiden Sie Essen oder Trinken für etwa eine Stunde nach der Anwendung, damit der Schutzfilm optimal anhaftet.

Wie lange können Sie GeloTonsil® Gurgelgel anwenden?

GeloTonsil® Gurgelgel soll bis zum Abklingen der Beschwerden über mehrere Tage angewendet werden. Sollten sich Ihre akuten Beschwerden verschlimmern (z. B. Fieber, Halsschwellung, Gliederschmerzen) oder nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums. Bitte verwenden Sie GeloTonsil® Gurgelgel nach Anbruch nicht länger als 14 Tage.

Aufbewahrungshinweis:

GeloTonsil® Gurgelgel ist unter 25 °C aufzubewahren.

Medizinprodukte sorgfältig aufbewahren! Vor Kindern sichern!



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Straße 11
25551 Hohenlockstedt
Deutschland
Telefon: 04826 59-0
Telefax: 04826 59-109
Internet: www.pohl-boskamp.de
E-Mail: info@pohl-boskamp.de



Chargenbezeichnung



25 °C

unter 25 °C lagern



Gebrauchsanweisung
beachten



Hersteller



verwendbar bis



Stand der Information: Februar 2022

POHL BOSKAMP 