



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch,
bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen,
denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser
Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres
Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese
später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen
oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren
Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht
in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter
fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen
und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin® Benzzydamin
gegen akute Halsschmerzen beachten?
3. Wie ist neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen
anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen
aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

neo-angin®

BENZYDAMIN

gegen **AKUTE
Halsschmerzen**

Zitronengeschmack

3 mg Benzzydaminhydrochlorid / Lutschtablette

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

1. Was ist neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen und wofür wird es angewendet?

neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen enthält den
Wirkstoff Benzzydaminhydrochlorid, der die therapeutische
Wirksamkeit erzielt.

neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen wird
angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren zur
symptomatischen, lokalen Behandlung von akuten Halsschmerzen,
die mit den typischen Entzündungssymptomen wie Schmerzen,
Rötung oder Schwellung im Mund- und Rachenraum einhergehen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich Ihr Befinden verschlech-
tert, Fieber auftritt oder Sie sich nach 3 Tagen nicht besser fühlen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen beachten?

neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen darf nicht
angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Benzzydaminhy-
drochlorid, Pfefferminzöl oder einen der in Abschnitt 6.
genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie neo-angin®

Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen anwenden,

- wenn Sie unter Phenylketonurie leiden.
- wenn Sie unter Asthma leiden oder gelitten haben.

- wenn Sie gegen Salicylate (z. B. Acetylsalicylsäure und
Salicylsäure) oder andere entzündungshemmende Arzneimittel,
die nichtsteroidale Antiphlogistika (NSA) genannt werden,
überempfindlich sind.
- wenn nach Anwendung des Arzneimittels die Schmerzen im Hals
schlimmer werden oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt,
Fieber, starke Halsschmerzen oder andere Symptome auftreten.
Sie sollten sich dann an Ihren Arzt wenden.

Kinder:

Aufgrund der Darreichungsform darf neo-angin® Benzzydamin
gegen akute Halsschmerzen erst bei Kindern ab 6 Jahren
angewendet werden.

**Anwendung von neo-angin® Benzzydamin gegen akute
Halsschmerzen zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere
Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel
eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht
verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten,
schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden,
fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder
Apotheker um Rat.

neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen soll während
der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen:**

neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen beeinträch-
tigt Ihre Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen nicht.

**Anwendung von neo-angin® Benzzydamin gegen akute Hals-
schmerzen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**
Nahrungsmittel und Getränke haben keinen Einfluss.

**neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen enthält
Isomalt und Aspartam:**

Bitte wenden Sie neo-angin® Benzzydamin gegen akute
Halsschmerzen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn
Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält 3,4 mg Aspartam pro Lutschtablette.
Aspartam ist eine Quelle für Phenylalanin. Es kann schädlich sein,
wenn Sie eine Phenylketonurie (PKU) haben, eine seltene
angeborene Erkrankung bei der sich Phenylalanin anreichert, weil
der Körper es nicht ausreichend abbauen kann.

3. Wie ist neo-angin® Benzzydamin gegen akute Halsschmerzen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser
Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt
oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem
Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre: Zur Schmerzlinderung lassen
Sie 3-mal täglich eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen.
Wenden Sie nicht mehr als 3 Lutschtabletten am Tag an.

Die Behandlung mit neo-angin® Benzzydamin gegen akute
Halsschmerzen darf nicht länger als 7 Tage dauern.

Sollten sich die Beschwerden verschlechtern oder nach 3 Tagen
keine Besserung eintreten, Fieber, starke Halsschmerzen oder
andere Symptome auftreten, wenden Sie sich an Ihren
behandelnden Arzt.





Kinder von 6 bis 11 Jahren:

Das Arzneimittel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen angewendet werden.

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum.

Eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen; nicht schlucken oder kauen.

Wenn Sie eine größere Menge von neo-angin® Benzhydamin gegen akute Halsschmerzen angewendet haben, als Sie sollten:

Im Falle der versehentlichen Anwendung zu vieler Lutschtabletten sollten Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker verständigen oder das nächstliegende Krankenhaus aufsuchen. Nehmen Sie die Packung mit, unabhängig davon, ob noch Lutschtabletten enthalten sind oder nicht.

In sehr seltenen Fällen sind bei Kindern nach der oralen Anwendung von Benzhydamin in einer Dosierung, die ca. 100-mal höher als die der Lutschtabletten war, Erregung, Krampfanfälle, Schweißausbrüche, Störung in der Bewegungskoordination (Ataxie), Zittern und Erbrechen aufgetreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Folgende Nebenwirkungen wurden beobachtet:

Sehr häufig: kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen

Häufig: kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

Selten: kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen

Sehr selten: kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich:

- empfindliche Haut gegenüber Sonnenlicht (verursacht Hautausschlag oder Sonnenbrand).

Selten:

- Mundbrennen und Mundtrockenheit. Wenn dies bei Ihnen auftritt, trinken Sie schluckweise ein Glas Wasser, um den Effekt zu verringern.

Sehr selten:

- Plötzliche Schwellung im Mund- und Rachenraum oder der Schleimhäute (Angioödem, die Symptome äußern sich in Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Hautausschlag, Jucken, Nesselausschlag oder Schwellung des Gesichtes, der Hände und Füße, Augen, Lippen und/oder Zunge, Schwindel).
- Schwierigkeiten beim Atmen (Laryngospasmus oder Bronchospasmus).

Nicht bekannt:

- Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeit)
- Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion (anaphylaktischer Schock), können umfassen: Atemnot (Schwierigkeiten beim Atmen), Brustschmerz, Brustenge, Schwindel, Schwächegefühl, starker Juckreiz der Haut, tastbare Knoten auf der Haut, Schwellung des Gesichtes, der Lippen, der Zunge und/oder der Kehle und potenziell lebensbedrohlich sein.
- Lokaler Empfindlichkeitsverlust der Mundschleimhaut (Hypoästhesie, oral).

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist neo-angin® Benzhydamin gegen akute Halsschmerzen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis (Blisterpackung) und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arnzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Was neo-angin® Benzhydamin gegen akute Halsschmerzen enthält:

Der Wirkstoff ist: Benzhydaminhydrochlorid
Eine Lutschtablette enthält 3 mg Benzhydaminhydrochlorid (entsprechend 2,68 mg Benzhydamin).

Die sonstigen Bestandteile sind:
Isomalt (E-953), Citronensäure-Monohydrat, Aspartam (E-951), Chinolingelb (E-104), Zitronen-Aroma, Pfefferminzöl

Wie neo-angin® Benzhydamin gegen akute Halsschmerzen aussieht und Inhalt der Packung:

neo-angin® Benzhydamin gegen akute Halsschmerzen Zitronengeschmack sind gelbe, runde Lutschtabletten mit einem Durchmesser von 19 mm mit Zitronengeschmack.

Sie sind verfügbar in PVC-PVDC/Aluminium Blisterpackungen. Packungsgröße: 20 Lutschtabletten

Pharmazeutischer Unternehmer

Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1
50670 Köln
Telefon: 0800/1652-200
Telefax: 0800/1652-700
E-Mail: dialog@cassella-med.eu

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2019.