



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Gebrauchsanweisung: Informationen für den Anwender

neo-angin[®]
HALSSCHMERZLUTSCHER
junior

Schützen die Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen

1. Was sind neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher und wofür werden sie angewendet?

neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher ist ein Medizinprodukt zum Schutz von Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen. Isländisch Moos legt sich beim Lutschen als pflanzlicher Film auf Mund- und Rachenschleimhaut und schützt diese. Durch den Lutschvorgang wird eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe auf Mund- und Rachenschleimhaut gewährleistet. Calciumpantothenat dient als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut.

2. Wie sind neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher zusammengesetzt?

Ein neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher enthält:

6,66 mg Lichen Islandicus Trockenextrakt

1,50 mg Calciumpantothenat

Weitere Bestandteile sind:

Ascorbinsäure, Saccharose, Stärkesirup, Zitronensäure, Erdbeeraroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel, schwarze Johannisbeere, Rettich)

3. Wie und wie oft werden neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher angewendet?

Eine Packung enthält 8 neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher.

Wenden Sie neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher immer genau gemäß der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren lutschen bei Bedarf alle 2-3 Stunden einen neo-angin[®] junior Halsschmerzlutscher, maximal 3 Lutscher pro Tag. Wenn sich die Halsschmerzen nach 2-3 Tagen nicht bessern oder verschlechtern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Darf nur an Kinder ab 3 Jahren gegeben werden, die Lutscher sicher lutschen können. Laufen und Springen sind aufgrund des Unfallrisikos während des Lutschens zu vermeiden.

4. Wann dürfen neo-angin® junior Halsschmerzlutscher nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen neo-angin® junior Halsschmerzlutscher nicht angewendet werden.

5. Wann ist bei der Anwendung von neo-angin® junior Halsschmerzlutscher Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie oder Ihr Kind an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch rezeptfrei) anwenden.

6. Wie lange sind neo-angin® junior Halsschmerzlutscher haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von neo-angin® junior Halsschmerzlutscher ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen neo-angin® junior Halsschmerzlutscher nicht mehr verwendet werden.

7. Was ist ferner zu beachten?

neo-angin® junior Halsschmerzlutscher sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.



Stand der Information: März 2020

 Apothekenexklusiv



HCS HealthCare Supply GmbH
Schwester-Zita-Weg 11, 52080 Aachen,
Deutschland

Vertrieb: MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH,
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Deutschland