



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern  
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de)  
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:  
[www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender**  
**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack 1,2 mg/0,6 mg Lutschtabletten**

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** beachten?
3. Wie ist **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

**1. Was ist Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?**

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** ist ein Hals- und Rachen therapeutikum.

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack beachten?**

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen 2,4- Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** anwenden. Grundsätzlich ist bei durch Bakterien verursachten Infektionen die Notwendigkeit einer gezielten antibiotischen Behandlung abzuklären.

Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion ist die Behandlung mit einem geeigneten Antimykotikum (Medikament für die gezielte Behandlung von Pilzinfektionen) erforderlich.

**Kinder**

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

**Einnahme von Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittelleingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack:**

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol und Isomalt. Bitte nehmen Sie **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 0,459 g Maltitol und 1,834 g Isomalt entsprechend ca. 0,19 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol/Isomalt. Maltitol/Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, D-Limonen, Geraniol und Linalool.

Benzylalkohol, Citral, Citronellol, D-Limonen, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1mmol Natrium (23 mg) pro Lutschtablette, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

**3. Wie ist Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Dosierung:**

Die niedrigste wirksame Dosis sollte über den kürzesten Zeitraum, der für die Erreichung der Beschwerdefreiheit notwendig ist, angewendet werden.

**Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:**

Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen.

**Kinder unter 6 Jahren:**

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

**Ältere Patienten:**

Eine Dosisanpassung bei älteren Personen ist nicht erforderlich.

Die Tagesdosis sollte 8 Lutschtabletten nicht überschreiten.

**Art der Anwendung:**

Zur Anwendung im Mund - und Rachenraum. Um eine Reizung der Mundschleimhaut zu vermeiden, sollten Sie **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** - wie alle Lutschtabletten - während des Auflösens im Mund bewegen.

Sprechen Sie bitte mit einem Arzt,

- wenn Sie unter schweren Halsentzündungen oder Halsschmerzen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen leiden.
- wenn sich Ihre Beschwerden innerhalb von 3 Tagen nicht bessern oder gar verschlechtern.

**Wenn Sie eine größere Menge Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack angewendet haben, als Sie sollten:**

Nach versehentlicher Aufnahme einer Vielzahl von **Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1.000)**

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, allergische, schmerzhaftige Schwellung von Haut und Schleimhaut v.a. im Gesichtsbereich, Nesselsucht, Atemnot durch Verengung der Atemwege und Bluthochdruck mit kurzzeitiger Bewusstlosigkeit können auftreten.

Überempfindlichkeitsreaktionen klingen nach Absetzen des Medikamentes in der Regel rasch wieder ab. Bei Auftreten dieser Erscheinungen, die schon bei Erstanwendung vorkommen können, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10.000) **Magen-Darm-Beschwerden wie Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.**

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Magen-Darm-Beschwerden und ein unangenehmes Gefühl im Mund welches sich als Irritationen im Rachenbereich, orale Missempfindung (Kribbeln oder „Taubheit“) der Haut, Mundödem und Zungenbrennen äußern kann.

Benzylalkohol, Citral, Citronellol, D-Limonen, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack enthält:**

Die Wirkstoffe sind: 2,4- Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol.

1 Lutschtablette enthält 1,2 mg 2,4- Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronenaroma, Saccharin-Natrium, Weinsäure (Ph.Eur.), Maltitol, Isomalt (Ph.Eur.).

**Wie Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack aussieht und Inhalt der Packung:**

**Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack** sind farblose, runde Lutschtabletten und in Packungen zu 8, 16, 24, 36 und 48 Lutschtabletten erhältlich.

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH

Darwinstrasse 2-4

69115 Heidelberg

Tel.: (06221) 9982-333

**Hersteller:**

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Niederlande

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.**

