



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)



Franzbranntwein

Aktiv Gel

Latschenkiefer

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer
Wirkstoffe in 100 g Gel: D-Campher 0,986 g, Latschenkiefernöl 0,394 g
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden über 12 Jahre.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?
3. Wie sollen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist ein traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer sind.

Außerdem soll Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer nicht auf geschädigter Haut, z. B. bei Verbrennungen, Sonnenbrand, Ekzemen und offenen Wunden oder bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen (Exanthem), sowie auf der Schleimhaut und am Auge angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist erforderlich.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden

Untersuchungen vor. Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer soll deshalb bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

lassen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer vollständig einziehen und verwenden Sie keine Umschläge, Verbände oder Abdeckungen. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich.

Nicht im Bereich der Augen auftragen, der Kontakt von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer sollen die Hände gründlich gereinigt werden.

Bei Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Aus Sicherheitsgründen nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

3. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anzuwenden?
Wenden Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahre soll 1 bis 3-mal täglich ein ca. 2–3 cm langer Gelstrang Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer angewendet werden. Die Anwendung des Präparates sollte nicht unter abschließenden Verbänden und nicht gleichzeitig mit Wärmeanwendung erfolgen.

Wie sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Tragen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer auf die zu behandelnden Hautpartien auf.

Wie lange sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei Fortbestehen der Beschwerden befragen Sie Ihren Arzt.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Falls ein Kind versehentlich Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer verschluckt, ist es wichtig unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, der die notwendige Behandlung durchführen kann. Versuchen Sie nicht, Erbrechen herbeizuführen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr Selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer auftreten?

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch D-Campher Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Sehr selten können an Haut und Schleimhäuten Reizerscheinungen und allergische Reaktionen auftreten. In diesen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und dem Behältnis aufgedruckt. Arzneimittel sollten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer 1 Jahr haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält:

Die Wirkstoffe sind:

100 g Gel enthalten	D-Campher	0,986 g
	Latschenkiefernöl	0,394 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96 %, Citronenöl, Pfefferminzöl, Rosmarinöl, ätherisches Muskatöl, Trometamol, Carbomer 980, gereinigtes Wasser, Natriumsulfat, Chinolingelb (E 104), Patentblau V (E 131).

Inhalt der Packung: Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist in Originalpackungen mit 100 g und 150 g Gel erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln
Tel.: +49 (0) 221 / 16 52-0
Fax: +49 (0) 221 / 16 52-575

Mitvertreiber:

DIVAPHARMA GmbH, D-12274 Berlin

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, D-12277 Berlin

Unternehmen der



Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2015.