Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare. Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

Zum Produkt »

Acetocaustin®
Warzenmittel

LESEN SIE SICH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE ACETOCAUSTIN SÄUREBEHANDLUNG FÜR WARZEN VERWENDEN, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL BENUTZT HABEN. DIE INFORMATIONEN KÖNNEN SICH AUFGRUND NEUER STUDIEN UND ERKENNTNISSE GEÄNDERT HABEN, SEITDEM SIE DAS PRODUKT LETZTMALS VERWENDET HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

WOFÜR WIRD ACETOCAUSTIN WARZENMITTEL VERWENDET?
Acetocaustin Warzenmittel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen. Acetocaustin Warzenmittel enthält Monochloressigsäure, eine Substanz, die eine hornlösende (keratolytische) Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Die Monochloressigsäure zerstört die Zellen, die das Warzenvirus enthalten.

Der Vorteil des Acetocaustin Warzenmittels besteht darin, dass es schmerzfrei direkt auf die Warze aufgetragen werden kann, wodurch es bei einer korrekten Anwendung durch einen Erwachsenen auch für Kinder geeignet ist.

Acetocaustin Warzenmittel kann ausschließlich bei gewöhnlichen Warzen verwendet werden:

- Auftreten vor allem an Händen und Füßen
- Gleiche Farbe wie die Haut
- Umfang variiert zwischen weniger als einem Millimeter und mehr als einem Zentimeter
- Meist bilden sich mehrere Warzen gleichzeitig
- Die Kontamination erfolgt häufig durch direkten Kontakt, aber auch durch Handtücher oder kontaminierte Ober flächen
- Kratzen und Nägelkauen erhöhen das Risiko einer Infektion

Verwenden Sie Acetocaustin Warzenmittel nicht für Alterswarzen

- Können in verschiedenen Größen und Farben auftreten
- Durchschnittlicher Umfang zwischen 0,5 und 1 cm
- Zu Beginn oft als hautfarbene, gelbbraune oder graubraune Flecken zu erkennen. Später werden sie größer und dicker
- Sie sehen aus, als lägen sie auf der Hautoberfläche und ließen sich leicht abkratzen, sind aber tatsächlich fest mit der Haut verbunden
- Sie können überall am Körper auftreten, außer an den Handflächen und Fußsohlen sowie an den Lippen. Am wahrscheinlichsten treten sie auf der Brust, dem Rücken und dem Gesicht sowie dem Hals auf

Gebrauchsanweisung (Verbrennungen vorbeugen):

VORGEHENSWEISE:
- Auftragung durch Erwachsene;
- Nur an Händen und Füßen verwenden! Das Produkt nicht auf anderen Körperteilen anwenden;
- Die umliegende Haut mit Vaseline oder Zinksalbe einreiben, um die Haut zu schützen;
- Die Flasche auf einen festen Untergrund stellen, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist.
- Die Warze beim Auftragen nur einmal betupfen;
- Die Warze nur einmal pro Woche betupfen;
- Die Flüssigkeit nur mit der Warze in Kontakt kommen lassen;
- Den Kontakt mit gesunder Haut vermeiden;
- Die Flüssigkeit nach dem Auftragen gut trocknen lassen;
- Die Warze nicht abdecken;
- Das Ergebnis ist nach 1 Woche sichtbar;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES:
- Auftragung durch Personen unter 18 Jahren;
- Das Produkt auf Warzen an anderen Körperteilen als Händen und Füßen auftragen;
- Auftragen auf Warzen, die sich ganz oder teilweise unter einem Nagel befinden;
- Die Flüssigkeit mit der gesunden Haut in Kontakt kommen lassen;
- Auftragen, wenn Ihre Hände zittern oder Ihre Finger steif sind;
- Die Warze bei der Anwendung mehr als einmal betupfen;
- Die Warze nach dem Auftragen der Flüssigkeit abdecken;
- Auf Muttermale, Wasserwarzen, offene Wunden, Hyperpigmentierung, Alterswarzen, dunkel gefärbte haarige oder seltsam aussehende Warzen auftragen;
- Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Häufigeres Wiederholen der Behandlung als einmal die Woche.

⚠ **WARNUNGEN**
Verwenden Sie Acetocaustin Warzenmittel nicht in folgenden Fällen:
- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Wenn Sie empfindlich auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagieren. Verwenden Sie die Flüssigkeit niemals im Gesicht (die Flüssigkeit darf niemals mit den Augen sowie Nasen- und Mundschleimhäuten in Berührung kommen)
- Für Genitalwarzen oder im Genitalbereich
- Auf Muttermalen, Molluscum contagiosum, offenen Wunden, Leberflecken, Nävi, (braunen) Alterswarzen, dunkel gefärbten, haarigen oder seltsam aussehenden Warzen
- Bei roten, gereizten oder infizierten Warzen
- Unmittelbar nach einer chirurgischen Entfernung von Warzen, dem Einfrieren der Warze (Kryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt insbesondere, wenn die Haut nach der Behandlung gerötet ist oder schmerzt. Warten Sie in diesem Fall mindestens 4 Wochen, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig verschwunden ist. Erst danach können Sie Acetocaustin Warzenmittel für Warzen wieder verwenden.
- Während der Schwangerschaft oder der Stillzeit
- Bei Warzen, die ganz oder teilweise unter einem Nagel auftreten
- Die Warze max. einmal betupfen und den Vorgang nur bei Bedarf und nicht häufiger als einmal pro Woche wiederholen.

Verwenden Sie die Acetocaustin Warzenmittel in folgenden Fällen mit äußerster Sorgfalt:
- Bei von Zweifeln an der Diagnose (die Veränderung der Haut kann nicht eindeutig als Warze identifiziert werden)
- Bei Immunschwäche (z. B. wenn Sie Zytostatika einnehmen)
- Bei Diabetes oder anderen Beschwerden wie Gefäßerkrankungen, die zu einer schlechteren Wundheilung führen.

In diesen Fällen dürfen Sie die Acetocaustin Warzenmittel nicht anwenden, ohne vorher mit einem Arzt gesprochen zu haben.

⚠ **WARNUNGEN**
- Nur für die äußere Anwendung bestimmt
- Mit äußerster Vorsicht verwenden. Die Flüssigkeit des Acetocaustin Warzenmittels ist ätzend
- Wenn gesunde Haut mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, die Haut mit Wasser abspülen. Wenn die Haut trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen gereizt wird, muss die Stelle wie eine Verbrennung behandelt werden
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen.
- Die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen und aufrecht lagern
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Die Nutzung durch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischtüchern oder der Haut vermeiden.
- Bei Auftreten von Blasen die Anwendung abbrechen
- Die Warze max. einmal betupfen und den Vorgang nach einer Woche nur bei Bedarf wiederholen.

NEBENWIRKUNGEN
Das Acetocaustin Warzenmittel kann einige Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht in jedem Fall auftreten. Zu den Nebenwirkungen einer Anwendung von Acetocaustin Warzenmittel gehören Hautreizungen, ein brennendes Gefühl, Hautrötungen und Überempfindlichkeit der Haut. Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN
Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

INHALT ACETOCAUSTIN WARZENMITTEL
Eine Flasche mit 2 ml Lösung aus Monochloressigsäure (50 %) und gereinigtem Wasser (50 %). Ein spezieller Applikator zum Auftragen der Formulierung auf die Warze.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Lagern Sie Acetocaustin Warzenmittel bei einer Temperatur von 15–25 °C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung angegeben. Nach dem Öffnen nicht länger als 4 Wochen verwenden.

Weitere Informationen über Acetocaustin Warzenmittel finden Sie unter www.acetocaustin.de. Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Händler.

MEDIZINPRODUKT:
Acetocaustin Warzenmittel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
MD	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Warnung: Ätzende Substanz
0-3	Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden
LOT	Symbol für die Chargennummer
25°C 15°C	Das Produkt muss zwischen 15 ˚C und 25 ˚C gelagert werden

ANWENDUNG VON ACETOCAUSTIN WARZENMITTEL
(AUFTRAGUNG NUR DURCH ERWACHSENE):

Bitte wenden Sie Acetocaustin Warzenmittel mit äußerster Vorsicht an. Die Lösung ist stark ätzend. Seien Sie besonders vorsichtig beim Auftragen auf schwer zugänglichen Bereichen Ihrer Hände und Füße. Dies gilt insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gestörter Feinmotorik (zittrige Hände, steife Finger).

Das Acetocaustin Warzenmittel hat einen kindersicheren Verschluss, der wie folgt geöffnet werden kann: Stellen Sie die Flasche auf einen festen Untergrund, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Textilien und Tischdecken. Öffnen Sie die Flasche, indem Sie den Verschluss herunterdrücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Vor dem Entfernen der Verschlusskappe Vaseline oder Zinksalbe großzügig auf die gesunde Haut um die Warze herum auftragen.
Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Flasche.
Tragen Sie mit dem Spatel eine kleine Menge Acetocaustin Warzenmittel auf die Warze auf (lassen Sie die Flüssigkeit nicht heruntertropfen). Tragen Sie Acetocaustin Warzenmittel nur auf die Warze auf und betupfen Sie die Warze nur einmal.
Lassen Sie die Lösung einen Moment lang trocknen und bedecken Sie die Warze nicht. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch sorgfältig. Wenden Sie Acetocaustin Warzenmittel nicht häufiger als einmal pro Woche an.

Die Flüssigkeit benötigt eine Woche, um die oberste Schicht der Warze aufzulösen, sodass Sie nicht sofort nach der Anwendung ein Ergebnis sehen werden. Je nach Größe und Dicke der Warze kann es erforderlich sein, die Behandlung mit Acetocaustin Warzenmittel nach einer Woche zu wiederholen. Wiederholen Sie die Behandlung nicht innerhalb eines kürzeren Abstands als einer Woche.

ANWENDUNG NUR AUF HÄNDEN UND FÜSSEN

4+ JAHRE

2ml ℮ CE 0481

MD 25°C 15 °C

WARNUNG: UM VERBRENNUNGEN VORZUBEUGEN: LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCH!

HERSTELLER
PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17
5406 XP Uden
The Netherlands

LIEFERANT
TheOTClab
Fred.Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
The Netherlands